

Biopsja piersi

Czasami konieczne jest wykonanie biopsji piersi, która polega na pobraniu próbki tkanki piersi za pomocą cienkiej igły.

Po wykonaniu biopsji

W pierwszych dniach po biopsji w miejscu jej wykonania mogą wystąpić ból i zasinienie. Do rzadkich powikłań należy krwawienie tkanek i zakażenie miejsca wkłucia.

Miejsce biopsji

- Miejsce biopsji należy zabezpieczyć plastrem na 48 godzin. Miejsce wkłucia musi pozostać suche.
- Następnego dnia po biopsji można bezpiecznie zdjąć plaster, aby wziąć prysznic, jednak po kąpieli należy wymienić go na nowy.
- Nie należy kąpać się w wannie, wannie z hydromasażem ilub basenie dwie doby po zabiegu, ze względu na ryzyko infekcji.

Ćwiczenia i intensywna aktywność

Przez 48 godzin nie należy podnosić ciężkich przedmiotów (o masie ponad 5 kg) ani ćwiczyć, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia do tkanek piersi.

Ból

- W razie potrzeby można zastosować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, np. paracetamol.
- Przez dwa dni po biopsji nie zaleca się stosowania leków przeciwbólowych zawierających ibuprofen.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub przychodnią, ponieważ mogą one wskazywać na infekcję lub krwawienie w piersi:

- Gorączka przekraczająca 38,5°C
- Zaczerwienienie miejsca wkłucia lub piersi
- Wzmożony ból w miejscu biopsji
- Ropienie lub zwiększona ilość wydzieliny w miejscu wkłucia

Numery telefonów

Centrum leczenia chorób piersi w Landspítali jest czynne w dni robocze od 08:00 do 16:00

543 9560